



MEDICATION-ASSISTED TREATMENT Find Out If It's Right for You!

Medication-Assisted Treatment (MAT) is the use of medications, in combination with counseling and behavioral therapies, in the treatment of substance use disorders. MAT is recommended over medically supervised withdrawal by the Substance Use and Mental Health Services Association (SAMHSA), the World Health Organization (WHO) and the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).

Research shows that a combination of medication and evidence-based therapy is not only safe and effective, but the best course of treatment for many clients, including pregnant individuals.

TYPES OF MEDICATION-ASSISTED TREATMENT

The following is a list of the most common types of medication used in the treatment of alcohol and opioid use disorder. Ask your medical provider if these or other medications are right for you!

METHADONE

Methadone is an oral medication that is taken once daily under strict conditions and guidelines, to eliminate withdrawal symptoms from opiate dependence. Because Methadone is a full opiate agonist, it reduces cravings and blocks the "high" from opiates without providing a euphoric rush. When you first start treatment, your dosage will be adjusted until you feel a comfortable level of symptom relief and no drug cravings. Generally, it takes from two weeks to 30 days to reach an effective and therapeutic dose.

Methadone should not impair cognitive functioning, nor does it interfere with ordinary activities. It has also been approved to be used during pregnancy. You may experience some side effects from Methadone, but they usually do not outweigh the benefits of treatment. Please note: Methadone is not an effective treatment for dependence on other drugs.

BUPRENORPHINE

Like Methadone, Buprenorphine is another safe and effective medication to support recovery by relieving withdrawal symptoms from opiate dependence. Naloxone, an opioid antagonist, is sometimes added to Buprenorphine to make it less likely to be used by injection. Buprenorphine is administered in a film or tablet form that is dissolved under the tongue, and is taken daily or in alternate dosing regimens as ordered by a physician. It may take two weeks to 30 days to reach an effective and therapeutic dose.

Prior to initiating treatment with Buprenorphine, medical staff will assess you to determine whether it is right for you. Side effects may be possible, but they are usually minor and do not outweigh the benefits of treatment.

VIVITROL

Vivitrol, known generically as Naltrexone, blocks the effects of opioid medication, including pain relief or feelings of well-being that can lead to opioid abuse. Vivitrol is taken by mouth or an administered injection, as part of a treatment program for drug or alcohol dependence. An opioid antagonist or blocker, Vivitrol is appropriate for clients who have been detoxified from opioids and who are being treated for co-occurring alcohol use disorder.

As with any medication, side effects are possible. Naltrexone treatment is started after you are no longer dependent on narcotics. Before you start taking this medicine, be sure to tell your doctor if you think you are still having withdrawal symptoms. Vivitrol should be used with caution in clients with liver disease, moderate to severe renal impairment and women of childbearing age.

ACACIA NETWORK IS HERE TO HELP!

Acacia Network and our affiliates provide **integrated, trauma-informed addiction & substance use treatment programs** that serve individuals of all ages throughout New York State. Our holistic approach focuses on wellness and treating the whole individual, with robust treatment options that include: Inpatient (Residential) and Outpatient Treatment Programs; Chemical Dependency Outpatient Programs (CDOPs); Detox and Rehab; Harm Reduction, and more.

We accept most major insurances, as well as Medicaid and Medicare, and offer sliding scale fees and discounts for the uninsured. For more information, visit: [acacianetwork.org/addiction-services](https://www.acacianetwork.org/addiction-services)



ROOTED IN THE COMMUNITY SINCE 1969

TRATAMIENTO ASISTIDO POR MEDICAMENTOS

Explore las alternativas disponibles

El tratamiento asistido por medicamentos (M.A.T., por sus siglas en inglés) es el uso de medicamentos recetados, combinado con terapia, para tratar el trastorno de abuso de sustancias o adicción a los opioides. Los estudios demuestran que una combinación de terapia conductual con medicación es el método más eficaz para superar la adicción a los opioides, incluyendo en las personas embarazadas.

Muchas entidades principales de la salud a nivel nacional e internacional, tales como la Organización Mundial de la Salud (WHO) y la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) recomiendan el M.A.T.

TIPOS DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO

A continuación incluimos información acerca de los medicamentos disponibles para el tratamiento de adicción al alcohol y opioides. Pregúntele a su proveedor médico acerca de estas opciones y cuáles podrían ser las mejores para usted.

METADONA

La metadona es un medicamento que se toma diariamente bajo supervisión médica estricta, para ayudar a cortar los síntomas de abstinencia. La metadona pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opiáceos (narcóticos) que reducen los deseos de utilizar opioides. Durante su tratamiento, su médico ajustará la dosis de metadona hasta encontrar el nivel adecuado para manejar sus síntomas de abstinencia. Usualmente toma de 2 semanas a 30 días para encontrar la dosis ideal.

La metadona no debe afectar su funcionamiento cognitivo ni su capacidad para realizar actividades diarias. Su uso se ha aprobado en personas embarazadas. Aunque el uso de metadona puede tener efectos secundarios, los beneficios del tratamiento usualmente superan los riesgos. Tenga en cuenta que la metadona no es efectiva para tratar la adicción a otras sustancias.

BUPRENORFINA

Al igual que la metadona, la buprenorfina es un medicamento seguro y efectivo para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides, el cual ayuda a reducir el deseo de consumir opioides, los síntomas de abstinencia y el consumo general de otros opioides. La buprenorfina está disponible como tableta soluble, película para aplicar entre la encía y la mejilla o implante que se coloca debajo de la piel. Usualmente toma de 2 semanas a 30 días para encontrar la dosis ideal.

Antes de comenzar el tratamiento, su médico le hará una evaluación para determinar si este medicamento es apropiado para usted. Aunque la buprenorfina puede tener efectos secundarios, los beneficios del tratamiento usualmente superan los riesgos.

VIVITROL

El Vivitrol, conocido genéricamente como naltrexona, pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas de opiáceos. Actúa al disminuir la ansiedad por el alcohol y al bloquear los efectos de los opioides. La naltrexona le ayudará a evitar el consumo de drogas ilegales y alcohol, pero no prevendrá ni aliviará los síntomas de abstinencia. La naltrexona no debe usarse para tratar a quienes siguen consumiendo drogas ilegales o alcohol.

Al igual que con otros medicamentos, los efectos secundarios son posibles. Antes de iniciar su tratamiento, su médico le hará preguntas sobre su adicción y su salud, y se le hará un examen físico y pruebas médicas. Se debe tomar cautela con las personas que padezcan de problemas del hígado o riñones, así como las personas que puedan quedar embarazadas.

ACACIA NETWORK ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARLE

Acacia Network y sus entidades afiliadas proveen servicios integrados y bilingües en las áreas de salud primaria, mental y tratamiento contra la adicción. Nuestros programas a lo largo del estado de Nueva York ofrecen alternativas de tratamiento individualizadas, que incluyen programas ambulatorios, residenciales, tratamiento asistido por medicamentos, desintoxicación y rehabilitación, entre otros.

Aceptamos la mayoría de los planes médicos, así como Medicaid y Medicare, y ofrecemos tarifas escalonadas para las personas sin seguro médico. Para más información, visite: <https://acacianetwork.org/addiction-services>